

## **(tetano/difterico)**

### **Dif-TET-All USO PEDIATRICO**

#### **Vaccino difterico e tetanico adsorbito uso pediatrico**

##### Composizione:

Anatossine difterica e tetanica purificate ed adsorbite su idrossido di alluminio. Una dose di 0,5 ml contiene: Principi attivi: non meno di 30 U.I. di anatossina difterica purificata; non meno di 40 U.I. di anatossina tetanica purificata.

##### Eccipienti:

sodio etilmercurio tiosalicilato 0,05 mg; idrossido di alluminio 2 mg; sodio cloruro 4,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml.

##### Titolare AIC:

Chiron spa, via Fiorentina 1, Siena.

##### Produttore:

Biocine, Sovicille (Si), Loc. Bellaria-Rosia.

##### Controindicazioni:

Ipersensibilità accertata verso uno dei componenti della formulazione. Evitare la vaccinazione in caso di accertata ipersensibilità ai componenti del vaccino e durante qualsiasi affezione febbrile. Dif-Tet-All non è indicato per la vaccinazione degli adulti e dei bambini al di sopra dei 6 anni di età. Oltre questa età possono diventare più marcate e frequenti le reazioni di ipersensibilità specifica agli antigeni difterici acquisita dall'organismo attraverso contatti naturali. Il verificarsi di qualsiasi reazione neurologica successiva alla vaccinazione costituisce controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi di vaccino.

##### Precauzioni:

Come per ogni altro prodotto di natura biologica non può essere esclusa la comparsa di reazioni di ipersensibilità: mantenere disponibili adrenalina 1:1000 e corticosteroidi per trattare eventuali reazioni di tipo immediato.

##### Effetti indesiderati:

Reazioni locali da ipersensibilità, sebbene rare nella vaccinazione primaria, possono verificarsi nei soggetti che hanno ricevuto un numero rilevante di iniezioni di richiamo. Occasionalmente è stata osservata anche febbre o malessere. Nei punti di inoculo, specialmente se l'iniezione non è stata praticata come previsto per via intramuscolare profonda, può formarsi un piccolo nodulo che generalmente scompare nel giro di poche settimane. Sono sconsigliate applicazioni fredde o calde. Disturbi neurologici post-vaccinali e reazioni di ipersensibilità, conseguenti alla somministrazione di tutti i prodotti biologici, sebbene estremamente rari, devono essere sempre valutati. In tal caso si raccomanda di consultare il medico per adottare idonee misure terapeutiche. Rivolgersi comunque al medico in caso di reazioni diverse da quelle segnalate.

Revisionato dal Ministero della Sanità il 5/1995